

Chestionarul O'Leary/Sant – Scorul durerii și al tulburărilor micționale în cistita interstițială

A. SCORUL SIMPTOMELOR - Indicele Simptomelor (ICSI)	B. IMPACTUL SIMPTOMELOR - Indicele Impactului Simptomelor (ICPI)
2. În ultima lună ați fost nevoit să urinați din nou, la mai puțin de 2 ore, după urinarea precedentă?	2. Trezirea noaptea pentru a urina
☐ 0 Deloc	☐ 0 Nicio problemă
☐ 1 Mai puțin de o dată din 5 situații	☐ 1 O foarte mică problemă
☐ 2 Mai puțin de jumătate din situații	☐ 2 O mică problemă
☐ 3 Jumătate din situații	☐ 3 O problemă moderată
☐ 4 Mai mult de jumătate din situații	☐ 4 O problemă mare
☐ 5 Aproape întotdeauna	
3. În ultima lună, de câte ori v-ați trezit noaptea pentru a urina?	3. Senzația bruscă de a urina, care nu poate fi amânată
☐ 0 Niciodată	☐ 0 Nicio problemă
☐ 1 O dată pe noapte	☐ 1 O foarte mică problemă
☐ 2 De 2 ori pe noapte	☐ 2 O mică problemă
☐ 3 De 3 ori pe noapte	☐ 3 O problemă moderată
☐ 4 De 4 ori pe noapte	☐ 4 O problemă mare
☐ 5 De mai mult de 5 ori	
4. În ultima lună, cât de des ați simțit durere sau arsură în vezica urinară?	4. Arsurile, durerea, disconfortul sau presiunea în vezica urinară
☐ 0 Deloc	☐ 0 Nicio problemă
☐ 1 O dată	☐ 1 O foarte mică problemă
☐ 2 De câteva ori	☐ 2 O mică problemă
☐ 3 Destul de des	☐ 3 O problemă moderată
☐ 4 Aproape întotdeauna	☐ 4 O problemă mare
☐ 5 Continuu	

INTERPRETAREA SCORULUI O'LEARY/SANT

Indicele Simptomelor (ICSI)

Scor: _____ / 20 puncte

Evaluează frecvența urinărilor, nicturia, urgența micțională și durerea/disconfortul vezical.

Indicele Impactului Simptomelor (ICPI)

Scor: _____ / 16 puncte

Evaluează impactul acestor simptome asupra calității vieții pacientului.

SCOR TOTAL O'LEARY/SANT

Scor: _____ / 36 puncte

Interpretarea scorului total

- ☐ **0–6 puncte** – Simptome absente sau minime (risc scăzut)
- ☐ **7–13 puncte** – Simptome ușoare până la moderate
- ☒ **14–36 puncte** – Simptome severe, sugestive pentru sindromul vezicii dureroase / cistită interstițială; se recomandă evaluare urologică completă.